

ABSCHÄTZUNG DER GLOMERULÄREN FILTRATIONSRATE (eGFR)

GFR nach Cockroft-Gault ist laut der Leitlinie nicht mehr empfehlenswert. Falls Sie eine abweichende GFR-Formel verwenden möchten, bitte auf dem Schein vermerken. Diese wird zusätzlich als Textbefund berechnet und eingetragen.

mGFR: gemessene GFR mittels Iohexol

PATIENTEN	PARAMETER-KÜRZEL	GESCHÄTZT NACH	EINHEIT	BENÖTIGTE ANGABEN	ÜBEREINSTIMMUNG MIT mGFR	HINWEIS
Senioren (≥ 70 Jahre)						
Erwachsene (m, w), ≥ 70 Jahre	GFR	BIS1-Formel	ml/min/1,73 qm	KREA	95 %	Normalpatient GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert).
Erwachsene (m, w), ≥ 70 Jahre mit deutlicher Abweichung der Körperoberfläche von der Norm	GFRON	BIS1-Formel	ml/min	KREA, Gewicht (kg), Körpergröße (cm)	95 %	GFR bezieht sich auf die individuelle Körperoberfläche und schätzt die Nierenfunktion genauer ein (nicht normiert).
Erwachsene (m, w), ≥ 70 Jahre	GFR	BIS2-Formel	ml/min/1,73 qm	KREA, CYSTATIN C	96 %	Normalpatient GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert). Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst.
Erwachsene (m, w), ≥ 70 Jahre mit deutlicher Abweichung der Körperoberfläche von der Norm	GFRON	BIS2-Formel	ml/min	KREA, CYSTATIN C, Gewicht (kg), Körpergröße (cm)	96 %	GFR bezieht sich auf die individuelle Körperoberfläche und schätzt die Nierenfunktion genauer ein (nicht normiert).
Erwachsene (m, w), ≥ 70 Jahre	GFR	CDK-EPI-CYS	ml/min/1,73 qm	CYSTATIN C	89 %	Normalpatient GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert). Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst.

weiter auf Seite 2

Erwachsene (18 – 69 Jahre)

Erwachsene (m, w), ≥18 bis < 70 Jahre	GFR	CKD-EPI-KREA	ml/min/1,73 qm	KREA	84 %	Normalpatient GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert).
Erwachsene (m, w) ≥18 bis < 70 Jahre mit deutlicher Abweichung der Körperoberfläche von der Norm	GFRON	CKD-EPI-KREA	ml/min	KREA, Gewicht (kg), Körpergröße (cm)	84 %	GFR bezieht sich auf die individuelle Körperoberfläche und schätzt die Nierenfunktion genauer ein (nicht normiert).
Erwachsene (m, w), ≥18 bis < 70 Jahre	GFR	CKD-EPI-CYS	ml/min/1,73 qm	CYSTATIN C	86 %	Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst. GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert).
Erwachsene (m, w), ≥18 bis < 70 Jahre	GFR	CKD-EPI-KREA-CYS	ml/min/1,73 qm	KREA, CYSTATIN C	92 %	Normalpatient GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert). Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst.
Erwachsene (m, w) ≥18 bis < 70 Jahre mit deutlicher Abweichung der Körperoberfläche von der Norm	GFRON	CKD-EPI-KREA-CYS	ml/min	KREA, CYSTATIN C, Gewicht (kg), Körpergröße (cm)	92 %	Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst. GFR bezieht sich auf die standardisierte Körperoberfläche von 1,73 qm (normiert).

Kinder und Jugendliche (< 18 Jahre)

Kinder u. Jugendliche >1 bis <18 Jahre	GFR	Schwartz	ml/min	KREA, CYSTATIN C, Größe (cm)	84 %	Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst.
Kinder u. Jugendliche >1 bis <18 Jahre	GFR	Schwartz	ml/min	KREA, CYSTATIN C, Harnstoff, Größe (cm)	88 %	Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst.
Kinder <1 Jahr	GFR	Schwartz-Bedside	ml/min	KREA, Größe (cm)	75 %	
Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre	GFR	CKD-EPI-CYS	ml/min	CYSTATIN C	70 %	Cystatin C ist unabhängig von Ernährung und Muskelmasse und wird nicht durch entzündliche Prozesse beeinflusst.

MÖGLICHKEITEN DER ANFORDERUNG DER eGFR

Order Entry

über die Maske

über die Katalogsuche, Kürzel: GFR

Niere / Urin

- ☐ Urinstatus
- ☐ Urinsediment
- ☐ Gesamteiweiß im SU
- ☐ Albumin im U
- ☐ BJ-Proteine im 2.MU
- ☐ BJ-Proteine im SU
- ☐ Albumin
- ☐ Kreatinin
- ☐ Cystatin C
- ☐ GFR / 1,73 qm KOF
- ☒ GFR / KOF des Pat.

Schnellbearbeitung

☐ Notfall

☐ Befund eilt

Abnahmedatum und -zeit

Abrechnung

Privatpatient

Behandlungsart

Unbekannt

Gewicht / Größe

kg cm

Schwangerschaft bekannt

(nicht angegeben)

Bitte beachten Sie:
Bei GFR/KOF des Pat. sind Angaben von
Größe und Gewicht erforderlich.

Kombibeleg

Niere / Urin	
☐ Sammelmenge:	
☐ Sammelzeit:	
☐ Urinstatus	U
☐ Urinsediment	U
☐ Gesamteiweiß i. Urin	SU
☐ Albumin i. Urin	U2
☐ BJ-Protein	U2
☐ Albumin i. Serum	S
☐ Kreatinin	S
☐ GFR-Cystatin C	S
☐ GFR / KOF 1,73 qm	S
☐ GFRON / KOF aus	S
☐ Größe:	
☐ Gewicht:	